

中毒110番 誤飲一覧表

誤飲物質		危険度	対応・家庭での処置
洗剤類			
トイレ用 などの 住宅用 洗剤	酸性 アルカリ性	★★★★	牛乳を飲ませて受診。 吐かせない。
	中性	★★★	一口以上飲んだ可能性があれば牛乳を飲ませて受診。 吐かせない。
漂白剤(原液)		★★★★	牛乳を飲ませて受診。吐かせない。
台所用洗剤		★★★	牛乳を飲ませるが吐かせない。漂白剤入りや濃縮タイプは少量でも受診。 それ以外はなめた程度なら様子を見る。
洗濯用洗剤		★★★	牛乳を飲ませるが吐かせない。漂白剤入りや濃縮タイプは少量でも受診。 それ以外はなめた程度なら様子を見る。
石鹼		★	大量でなければ心配ない。牛乳を飲ませる。
化粧品			
マニキュア・除光液		★★★★	少量でも受診。何も飲ませず吐かせない。
化粧水		★	一口くらいなら様子を見る。たくさん飲んで顔が赤くなったり苦しそうなら受診。
乳液・口紅		★	よほどの大量でなければ心配ない。
シャンプー		★	少量であれば牛乳を飲ませて様子を見る。
香水・オーデコロン		★★★	なめた程度なら様子を見る。飲んだときは牛乳を飲ませ、吐かせて受診。
日焼け止めローション		★★★	なめた程度なら様子を見る。たくさん飲んだときは牛乳を飲ませ、吐かせる。
身の回りの品			
液体蚊取り		★★★	なめた程度なら様子を見る。一口以上飲んでいれば受診。 何も飲ませず吐かせない。
防虫剤	しょうのう	★★★★	少量でも受診。何も飲ませず吐かせない。
	ナフタリン	★★★★	なめた程度なら様子を見る。少しでも食べていれば水を飲ませて吐かせ受診。
	パラジクロロ ベンゼン	★★★★	かけら位なら心配ない。 1/4個以上食べていれば水を飲ませて吐かせ、受診。
ボタン電池		★★★★	飲んでいればすぐに受診。
食品 乾燥剤	生石灰	★★★★	牛乳を飲ませてすぐに受診。吐かせない。
	シリカゲル	★	心配ない。
芳香剤		★	固形・ゲル状のものは心配ない。液状のものは水か牛乳を飲ませて吐かせる。
タバコ		★★★	1本以上で致死量。2cm未満なら様子を見る。それ以上なら吐かせて受診。 何も飲ませない
吸殻入りの水		★★★★★	少量でも飲んでいれば受診。何も飲ませない。
ホウ酸団子		★★★★	水を飲ませて吐かせ、受診。(商品によってホウ酸含有量は異なる)
灯油・ベンジン ガソリン		★★★★★	少量でも(なめた程度でも)すぐに受診。 何も飲ませず吐かせない。